



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città metropolitana di Milano



ASSOCIAZIONE ALTOMILANESE di DIAGNOSTICA VASCOLARE O.N.L.U.S.

L'Amministrazione Comunale, unitamente all'Associazione ADIVA onlus, dopo lo svolgimento della campagna di prevenzione dell'Ictus cerebrale mediante screening ecoDoppler carotideo su cittadini del Comune di Boffalora sopra Ticino di età compresa fra 60-75 anni che non siano già stati sottoposti a tale indagine **espone** i seguenti dati statistici che attestano l'efficacia del lavoro svolto

Risultati Ecodoppler	549 pazienti		Età media
Negativo	333	60,7%	65,8
Stenosi fra il 20-40%	172	31,3%	67,5
Stenosi fra il 40-60%	40	7,3%	68,5
Stenosi >60%	3	0,5%	74,3
Occlusa	1	0,2%	72,0

Consigli: 172 correzione stili vita, 40 stile vita + terapia medica, 3 valutare terapia chirurgica.

Risultati Ecodoppler	Familiarità		Iperensione		Diabete		Fumo		Dislipid.	
Negativo	197	59,2%	116	34,8%	16	4,8%	57	17,1%	48	14,4%
Stenosi fra il 20-40%	101	58,7%	94	54,7%	29	16,9%	52	30,2%	65	37,8%
Stenosi fra il 40-60%	20	50,0%	27	67,5%	11	27,5%	19	47,5%	16	40,0%
Stenosi >60%	3	100,0%	2	66,7%	1	33,3%	1	33,3%	2	66,7%
Occlusa	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%

Risultati Ecodoppler	Fino ai 60 anni (49 pazienti)		Tra i 61 e 70 anni (385 pazienti)		Oltre i 70 anni (115 pazienti)		Tot	%
Negativo	38	77,6%	247	64,2%	48	41,7%	333	60,7%
Stenosi fra il 20-40%	9	18,4%	112	29,1%	51	44,3%	172	31,3%
Stenosi fra il 40-60%	2	4,1%	26	6,8%	12	10,4%	40	7,3%
Stenosi >60%	0	0%	0	0,0%	3	2,6%	3	0,5%
Occlusa	0	0%	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%

Età: l'età influenza l'incidenza della malattia carotidea

Risultati Ecodoppler	Nessun Fat Risc (79 pazienti)		1 o 2 Fattori Rischio (365 pazienti)		Più di 2 Fat Risc (105 pazienti)	
Negativo	65	82,3%	239	65,5%	29	27,6%
Stenosi fra il 20-40%	12	15,2%	106	29,0%	54	51,4%
Stenosi fra il 40-60%	2	2,5%	18	4,9%	20	19,0%
Stenosi >60%	0	0,0%	1	0,3%	2	1,9%
Occlusa	0	0,0%	1	0,3%	0	0,0%

Fattori di rischio: la presenza di più fattori di rischio aumenta sensibilmente la probabilità di malattia

Risultati Ecodoppler	Maschi (236 - 43%)		Femmine (313 - 57%)	
Negativo	120	50,8%	213	68,1%
Stenosi fra il 20-40%	88	37,3%	84	26,8%
Stenosi fra il 40-60%	25	10,6%	15	4,8%
Stenosi >60%	3	1,3%	0	0,0%
Occlusa	0	0,0%	1	0,3%

Sesso: il sesso maschile ha incidenza maggiore di malattia vascolare